



SyrSpend® SF

Compatibiliteitstabel

Legende

- Verenigbare combinatie gedurende 30 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 60 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 90 dagen
- ⊗ Combinatie niet aanbevolen

Temperatuur voor bewaring

- 🏠 15-25°C
- ❄️ 2-8°C

Rechtstreeks suspendeerbaar**

- ✔️ Bevochtigen niet nodig
- ❌ Bevochtigen voor suspenderen nodig

API

API	Concentratie	Gebruikelijke concentraties	SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)	SYRSPEND® SF PH4 (DRY)*	SYRSPEND® SF ALKA (DRY)*
Acetazolamide	25 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Allopurinol	20 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Alprazolam	1 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Aminofylline°	3 - 21 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Amiodaron HCl	5 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Amitriptyline HCl	10 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Amlodipine besilaat	1 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Atenolol	1 - 5 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Atropine sulfaat	0.1 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Azathioprine°	50 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Baclofen	2 - 10 mg/ml		● ❄️ ❌	● ❄️	⊗
Caffeïne	10 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Captopril	0.8 mg/ml	14 d.	● ❄️ ✔️	14 d. ❄️	⊗
Carbamazepine	25 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Carvedilol	1 - 5 mg/ml		● ❄️ ❌	● ❄️	⊗
Celecoxib (capsules)	10 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Chloralhydraat	100 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Chloroquine fosfaat	15 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Cholecalciferol (Vit. D3)	50,000 IU/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Ciclosporine A	100 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Ciprofloxacin	50 mg/ml	● / ●	❄️ / 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Clomipramine HCl	5 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Clonazepam	0.2 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Clopidogrel bisulfaat (tabletten)	5 mg/ml		● ❄️ ✔️	● ❄️	⊗
Cyanocobalamine (Vit. B12)	0.2 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Dapsone	2 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Dexamethasone	1 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Diltiazem HCl	12 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Dipyridamole	10 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Domperidone	5 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Enalapril maleaat	1 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Esomeprazole magnesium	3 mg/ml		⊗ 🏠 ❌	⊗ ❄️	● ❄️
Fenobarbital	9-15 mg/ml		● ❄️ ❌	● ❄️	⊗
Fenytoïne	15 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Flecainide acetaat (tabletten)	20 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Foliumzuur	1 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Furosemide	10 mg/ml		⊗ 🏠 ❌	⊗ ❄️	14 d. ❄️
Gabapentine	50 mg/ml	125 d. / ●	❄️ / 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Glutamine	250 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Glycopyrrolaat (glycopyrrolonium bromide)	0.5 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Granisetron HCl°	0.05 mg/ml		● 🏠 ✔️	● ❄️	⊗
Griseofulvine	25 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Haloperidol	0.5 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗
Hydralazine HCl°	4 mg/ml	2 d.	● ❄️ ✔️	2 d. ❄️	⊗
Hydrochlorothiazide	2-5 mg/ml		● ❄️ ❌	● ❄️	⊗
Hydrocortisone	1 mg/ml		● 🏠 ❌	● ❄️	⊗

SyrSpend® SF

Compatibiliteitstabel

Legende

- Verenigbare combinatie gedurende 30 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 60 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 90 dagen
- ⊗ Combinatie niet aanbevolen

Temperatuur voor bewaring

- 🏠 15-25°C
- ❄️ 2-8°C

Rechtstreeks suspendeerbaar**

- ✔️ Bevochtigen niet nodig
- ❌ Bevochtigen voor suspenderen nodig

API

API	Gebruikelijke concentraties	SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)			SYRSPEND® SF PH4 (DRY)*	SYRSPEND® SF ALKA (DRY)*
Hydrocortisone waterstofsuccinaat	2 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Hydrocortisone natriumfosfaat	2 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Imipramine HCl	5 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Isoniazide	10 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Itraconazol	20 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Ketoconazole	20 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Ketoprofen	20 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Kinidine sulfaat	10 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Labetalol HCl (tabletten)	40 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Lamotrigine	1 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Levodopa/carbidopa	5/1.25 mg/ml	● / ●	❄️ / 🏠	❌	●❄️	⊗
Levofloxacin	50 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Lisinopril dihydraat	1 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Loperamide HCl	1 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Lorazepam	1 mg/ml	●	❄️	❌	●❄️	⊗
Mebeverine HCl	10 mg/ml	● / ●	❄️ / 🏠	✔️	●❄️	⊗
Melatonine	3 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Mercaptopurine	10 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Methadone HCL	10 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Methotrexaat	2,5 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Metolazone°	1 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Metoprolol tartraat	10 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Metronidazole benzoaat	80 mg/ml	716 d. / 366 d.	❄️ / 🏠	❌	●❄️	⊗
Midazolam HCl	1 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Minocycline HCl	10 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Nadolol	10 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Naltrexon HCl	1 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Naproxen	25 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Natrium diclofenac	5 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Nifedipine	4 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Nitrendipine°	5 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Nitrofurantoin°°	2 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Omeprazole	2 - 5 mg/ml	⊗	⊗	⊗	⊗	●❄️
Ondansetron HCl	0.8 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Oseltamivir fosfaat (capsules)	6 - 15 mg/ml	●	❄️	✔️	●❄️	⊗
Oxandrolone	3 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Pantoprazole natrium	3 mg/ml	⊗	⊗	⊗	⊗	●❄️
Paracetamol (acetaminophen)	50 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Penicillamine	50 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Pentoxifylline	20 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Prednisolone natriumfosfaat	1.5 mg/ml	●	🏠	✔️	●❄️	⊗
Pregabaline	20 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Propranolol HCl	0.5-5 mg/ml	●	❄️	✔️	●❄️	⊗
Propylthiouracil	5 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Pyrazinamide°	100 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗
Pyridoxine HCl (Vit. B6)	50 mg/ml	●	🏠	❌	●❄️	⊗

SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)



SYRSPEND® SF PH4 (DRY)*

CNK 3267-994 | Unit Dose voor 100 ML



SYRSPEND® SF ALKA (DRY)*

CNK 3156-049 | 40 G
CNK 3260-130 | Unit Dose voor 100 ML



Legende

- Verenigbare combinatie gedurende 30 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 60 dagen
- Verenigbare combinatie gedurende 90 dagen
- ⊗ Combinatie niet aanbevolen

Temperatuur voor bewaring

- 15-25°C
- 2-8°C

Rechtstreeks suspendeerbaar**

- Bevochtigen niet nodig
- Bevochtigen voor suspenderen nodig

API

API	Concentratie	Gebruikelijke concentraties	Temperatuur	Bevochtigen	SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)	SYRSPEND® SF PH4 (DRY)*	SYRSPEND® SF ALKA (DRY)*
Ranitidine HCl	15 mg/ml	● / ●	/		/		⊗
Riboflavine (Vit. B2)	10 mg/ml	●					⊗
Rifampicine	25 mg/ml	●					⊗
Sertraline HCl	10 mg/ml	●					⊗
Sildenafil citraat	2.5 mg/ml	●					⊗
Simvastatine	1 mg/ml	●					⊗
Sotalol HCl (tabletten)	5 mg/ml	●					⊗
Spirolacton	2-25 mg/ml	●					⊗
Sulfadiazine	100 mg/ml	●					⊗
Sulfasalazine	100 mg/ml	●					⊗
Sumatriptan succinaat°	5 mg/ml	21 d.				21 d.	⊗
Tacrolimus monohydraat	0,5-1 mg/ml	●					⊗
Terbinafine HCl	25 mg/ml	●					⊗
Tetracycline HCl	25 mg/ml	●					⊗
Theofylline°	5 mg/ml	●					⊗
Thiamine HCl (Vit. B1)	100 mg/ml	●					⊗
Tiagabine HCl (tabletten)	1 mg/ml	● / ●	/		/		⊗
Topiramaat	5 mg/ml	●					⊗
Tramadol HCl	10 mg/ml	●					⊗
Trimethoprim	10 mg/ml	●					⊗
Ursodesoxycholzuur (ursodiol)	20-30 mg/ml	66 d.					⊗
Valaciclovir HCl°	50 mg/ml	14 d.				14 d.	⊗
Valsartan	4 mg/ml	●					⊗
Vancomycine HCl	25-50 mg/ml	●					⊗
Verapamil HCl	50 mg/ml	●					⊗
Warfarine°	1 mg/ml	44 d.				44 d.	⊗
Zonisamide	10 mg/ml	●					⊗

Bereidingsinstructies

SYRSPEND® SF PH4 LIQUID



- Weeg het actief bestanddeel af en verwrijf indien nodig in een mortier tot een fijn poeder.
- Bevochtig het poedermengsel met een kleine hoeveelheid SyrSpend® SF Liquid, zodat een homogene pasta wordt bekomen.
- Voeg, volgens de geometrische diluatiemethode, SyrSpend® SF PH4 Liquid toe tot eindvolume.
- Vul af in een geschikt eindrecipiënt.

Etiket: schudden voor gebruik



SYRSPEND® SF ALKA DRY

(poeder voor reconstitutie, pot 40g)

- Weeg de juiste hoeveelheid SyrSpend® SF Alka af (6,3g per 100ml suspensie) en breng over in een geschikt eindrecipiënt.
- Weeg het actief bestanddeel af en voeg bij de SyrSpend® SF Alka in het eindrecipiënt.
- Homogeniseer de poeders door schudden.
- Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig.

Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

Lever de suspensie steeds af met maatbeker of doseerspuit voor een accurate dosering.



CNK 3115-789 - maatbeker 15ml
CNK 3311-339 - dose pack met doseerspuit

SYRSPEND® SF PH4 DRY EN ALKA DRY

(poeder voor reconstitutie, UD verpakking)



- Weeg het actief bestanddeel af en breng over in het recipiënt met SyrSpend® SF PH4 6,5g / Alka 6,3g.
- Homogeniseer de poeders door schudden.
- Voeg water toe tot eindvolume en schud krachtig.

Etiket: schudden voor gebruik + in de koelkast bewaren

* Studie uitgevoerd door onafhankelijke wetenschappelijke werkgroep zonder Fagron toezicht.

** De combinatie van nitrofurantoin met SyrSpend® SF PH4 (liquid) vereist een aangepaste bereidingswijze. Raadpleeg fagron.be.

* Suspensies met SyrSpend® SF (dry) zijn vrij van bewaarmiddelen en dienen steeds bewaard te worden tussen 2°C en 8°C.

** Procedure voor bevochtiging: voeg q.s van SyrSpend® SF PH4 (liquid) toe.